

## 7 有关接种新冠病毒疫苗的不良反应

更新日：2022 年 6 月 16 日更新

### ◆ 有关不良反应

现在日本国内承认使用的新冠病毒疫苗，接种后会出现的一些常见的不良反应为接种部位疼痛，疲乏，头疼，肌肉酸痛或关节疼痛，发冷，发热等。这些症状的绝大多数都会在接种后数日以内缓解消退。

有关接种时的注意事项等请参阅预防接种说明书。如对接种有疑虑或不安的人士，请与您经常就诊的医生或给岩手县新冠病毒疫苗专门咨询呼叫中心打电话咨询。

接种数日后仍有疑似不良反应的严重或一直持续时，请与您经常就诊的医生或给岩手县新冠病毒疫苗专门咨询呼叫中心打电话咨询。

- 有关新冠疫苗预防接种的说明书

[有关辉瑞医药公司研发的疫苗 \[PDF 文书 / 201KB\]](#)

[有关武田 / 莫德纳公司研发的疫苗 \[PDF 文书 / 205KB\]](#)

- 有关接种新冠病毒疫苗后出现不良反应时的处理方法。

[（厚生劳动省）有关辉瑞医药公司、武田 / 莫德纳公司研发的疫苗 \[PDF 文书 / 233KB\]](#)

### ◆ 关于 10~29 岁年龄层的人群（男性）接种武田 / 莫德纳公司研发的疫苗

厚生劳动省关于对 10~29 岁年龄层的人群（男性）接种新冠病毒疫苗之事宜发表了以下内容，特此通知。

1. 接种辉瑞医药公司研发的疫苗和武田 / 莫德纳公司研发的疫苗后，有极少数发生心肌炎・心包炎的事例报告。
2. 10~29 岁年龄层的人群（男性），接种辉瑞医药公司研发的疫苗要比接种武田 / 莫德纳公司研发的疫苗发生心肌炎・心包炎的频度低。
3. 原则上第 1 针与第 2 针应接种同种疫苗。但对 10~29 岁年龄层的人群（男性），有意愿接种第 2 针应疫苗时，可以选择接种辉瑞医药公司研发的疫苗。

10~29 岁年龄层的人群（男性），第 1 针已经接种武田 / 莫德纳公司研发的疫苗，第 2 针想选择接种辉瑞医药公司研发的疫苗的话，请与奥州市新冠病毒疫苗接种免费电话咨询中心联系。

[对 10~29 岁年龄层的人群（男性）和其保护者（家人）的通知 \[PDF 文书 / 601KB\]](#)

## ● 免费电话咨询中心

### 新冠病毒疫苗接种免费电话咨询中心

■ 电话号码 ■

0120 - 40 - 10 - 63

**【温馨提示：误拨错电话号码】**

拨错电话号码打往其他企业、单位的电话与日俱增。

预约时，为了防止误打・打错电话，**请您一定确认好电话号码之后再拨。**

#### ・岩手县新冠病毒疫苗专门咨询呼叫中心

（有关接种新冠病毒疫苗后出现的不良反应等相关医学知识的咨询）

电话：0120 - 89 - 5670（免费电话）

受理时间：24 小时 / 365 天（含周六，周日，节假日）



◆ 有关预防接种健康被害救济制度

对因接种新冠病毒疫苗而产生不良反应导致健康问题，或是留下残疾等情况的患者为对象，基于预防接种法实施救济制度。如果健康被害是由于接种疫苗引起、并且经厚生劳动大臣的认定，可得到该制度支付的医疗费等补助。

详细内容请参阅厚生劳动省「有关预防接种健康伤害救济制度」的外部链接。

[\(厚生劳动省\) 有关预防接种健康伤害救济制度<外部链接>](#)